

Area de Beca: CM - Cs. Médicas
Título del Trabajo: EFECTIVIDAD DE LA ESCALA DENTAL DE CORAH PARA VALORAR LA ANSIEDAD DE LOS PACIENTES A ANESTESIA LOCAL PARA SU TRATAMIENTO.

Autores: SERRANO, DAVID O - RUIZ DIAZ DE CENTENO, ELENA O - BUFFIL, CARLOS E

E-mail de Contacto:

Teléfono:

Tipo de Beca: UNNE Pregrado

Resolución N°: 1012/12 CS

Período: 01/03/2013 - 28/02/2014

Proyecto Acreditado: "Influencia de la ansiedad del paciente sobre el sistema cardiovascular ante l anestesia local para una extracción dental".(P.I. N° J005/10). Año 2011

Lugar de Trabajo: Facultad de Odontología

Palabras Claves: Encuesta - Técnica Anestésica - Troncular.

Resumen:

La visita al Odontólogo es una de las situaciones que más ansiedad genera a las personas, esto tiene repercusión en el estado de salud bucal del mismo, deteriorándola, ya que evita que este acuda al tratamiento por más que sea necesario.

Con la anestesia local se puede suprimir el dolor en los pacientes que son sometidos a tratamientos odontológicos, esto adquiere mucha importancia ya que el individuo al ser sometidos a un tratamiento odontológico en el que se necesita realizar una anestesia local, sufren problemas de **ansiedad**.

La mayoría de los autores utilizaron y utilizan la escala dental de la ansiedad de Corah [DAS], para realizar el estudio de la valoración de la ansiedad. Esta tabla ideada por Norman Corah (1969), permite valorar cuantitativamente la ansiedad que se produce ante un tratamiento dental.

El objetivo general de este trabajo es determinar si esta escala de Corah realmente es efectiva para determinar la ansiedad de los pacientes y si el cuestionario que tiene confiabilidad y validez satisfactoria. En cuanto a los objetivos particulares son: establecer si el grado ansiedad se da por igual en individuos de ambos sexos e identificar si la ansiedad es similar en individuos jóvenes y adultos.

Se encuestraron un total de 20 pacientes, 10 de sexo masculino y 10 femenino, con una edad comprendida entre 16 y 85 años. Se seleccionaron aquellos sujetos que se le deba realizar una técnica de anestesia infiltrativa troncular para el nervio mandibular y lingual. Fueron excluidos de la muestra los pacientes no cooperativos, embarazadas, los que hayan tenido una experiencia odontológica traumática y los que estén por debajo o por encima de las edades establecidas.

Los pacientes fueron ubicados en el sillón dental, 10 minutos antes de la aplicación de la anestesia infiltrativa por un integrante del equipo, se solicitó al paciente que conteste el cuestionario para DAS de Corah.

Todos los datos recolectados se volcarán en una ficha confeccionada para tal fin y se analizarán estadísticamente con el Test no paramétrico del Chi Cuadrado de acuerdo a las variables establecidas

Los resultados parciales indicaron, que los pacientes de sexo femenino presentan un 70% de ansiedad ligera y un 30% de ansiedad moderada; en cuanto al sexo masculino un 45% presenta ansiedad moderada y el 65% se encuentra muy ansioso en el momento de practicar la técnica anestésica. Además estos resultados indicaron que la ansiedad de los pacientes disminuye en edades avanzadas.

Becario
(Firma)

Co-Autor
(Firma)

Co-Autor
(Firma)

Director de Beca
(Firma y Aclaración)

Director de Proyecto
(Firma y Aclaración)