



**SESIÓN DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS
XXXVIII
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - 2017**

 **COMISIÓN DE LA XXXVIII SESIÓN DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS
2017**

Presidente:

Dra. María Antonia Susana REVIDATTI

Secretaria:

Dra. Gladys Pamela TEIBLER

Vocales:

MV MSc Sara Noemi ULÓN
MV MSc Pablo MALDONADO VARGAS
Dr. José Luis KONRAD

Miembros del Comité de Admisión:

Dra. Adriana CAPELLARI
Dr. Hugo Alberto DOMITROVIC
Dra. Gladis Isabel REBAK
Dr. Fernando Augusto REVIDATTI
Dra. Silvia Irene BOEHRINGER
Dra. Lilian Cristina JORGE
Dra. Luciana CHOLICH

Evolución clínica de un paciente con Habronemiasis Cutánea en el Hospital de Clínica de Grandes Animales de la Facultad de Ciencias Veterinarias - UNNE

Lingor V. *, Alonso J.M., Bogado E.F., Capello B.P., Chileski G.S., Montesi A.M., Ríos E. E.

Hospital de Clínicas. Facultad de Ciencias Veterinarias-UNNE- Sargento Cabral 2139 (3400) Corrientes, Argentina. *lingorveronica@gmail.com

Resumen

La Habronemiasis Cutánea es una patología que produce granulomas cutáneos ulcerativos en caballos de todo el mundo. Es producida por tres nematodos: *Habronema muscae*, *H. majus* (*H. microstoma*) y *Draschiamegastoma* (*H. megastoma*). Los adultos habitan en el estómago del caballo y sus huevos y larvas son expulsados con las heces y son ingeridos por sus huéspedes intermediarios: *Musca Domestica* y *Stomoxys calcitrans*. Cuando las moscas se alimentan, depositan las larvas infecciosas sobre áreas húmedas o heridas abiertas, aunque también pueden penetrar piel intacta, las larvas que son depositadas cerca de la boca son deglutidas y completan el ciclo vital parasitario en el estómago del caballo. Se presenta a consulta al Hospital de Clínica de Grandes Animales de la FCV - UNNE un equino, sexo macho entero, raza indefinida, edad 2 años, pelaje alazán, peso 200kg. El animal presentó lesiones en la cara, cuello y región perineal. Las lesiones tenían característica inflamatoria granulomatosa, con ulceración y tejido de granulación exuberante con exudado serosanguinolento, de consistencia firme, con bordes irregulares y sin aumento de sensibilidad local y de color rojo subido. Se realizó el diagnóstico clínico presuntivo de Habronemiasis Cutánea, con pronóstico favorable para la vida del paciente. Se llevó a cabo la toilette de la herida y un tratamiento local tópico con sulfadiazina de plata 0,1g, lidocaína clorhidrato 0,2g e hidrocortisona 0,2g dos veces por día y se desparasitó al animal con ivermectina oral 0,2 mg /kg de PV. Se recomienda como método preventivo el control de moscas, la destrucción rápida y apropiada del estiércol y camas sucias. También la aplicación de repelentes de acción residual en los establos y sobre el caballo resulta beneficiosa.

Palabras clave: granuloma, piel, larva, toilette.