



**SESIÓN DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS
XXXVIII
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - 2017**

 **COMISIÓN DE LA XXXVIII SESIÓN DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS
2017**

Presidente:

Dra. María Antonia Susana REVIDATTI

Secretaria:

Dra. Gladys Pamela TEIBLER

Vocales:

MV MSc Sara Noemi ULÓN
MV MSc Pablo MALDONADO VARGAS
Dr. José Luis KONRAD

Miembros del Comité de Admisión:

Dra. Adriana CAPELLARI
Dr. Hugo Alberto DOMITROVIC
Dra. Gladis Isabel REBAK
Dr. Fernando Augusto REVIDATTI
Dra. Silvia Irene BOEHRINGER
Dra. Lilian Cristina JORGE
Dra. Luciana CHOLICH

Merms productivas en rodeos de cría bovina en el período preñez-parición debidas a enfermedades infecciosas.

Huber D. *, Espasandin A. G., Storani C. A., Cipolini M. F., Martínez D. E.¹

Cátedra de enfermedades Infecciosas. Facultad de Ciencias Veterinarias UNNE.

dalilamilenahuber@gmail.com

Resumen

En producción animal, se denomina merms preñez/parición a las pérdidas que se producen entre el porcentaje de preñez obtenida y el porcentaje de terneros destetados. El objetivo del trabajo es establecer cuáles son las principales causas atribuibles a las merms en el nordeste del país, para generar antecedentes actualizados sobre la situación de las enfermedades que afectan la producción. El trabajo se realizó en un Laboratorio de Red Nacional de SENASA de la ciudad de Corrientes. Se recopilaron los resultados de 256 muestras de sangre y mucus cérvico-vaginal de hembras, ingresadas para “síndrome de vacas vacías” (SVV) entre los años 2011 al 2016, provenían de las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa. El SVV comprende el análisis serológico de enfermedades que afectan a la reproducción. Los resultados obtenidos de las muestras procesadas evidenció un 70,31% para Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR), 62,5% Diarrea Viral Bovina (DVB), 24,22% Neosporosis, 12,1% Campylobacteriosis, 9,7% Leptospirosis, 6,2% Trichomoniasis, 5 % Brucelosis y solo 1,17% Clamidiosis, y en muchas oportunidades coexistían infecciones a más de una enfermedad en el mismo animal. El 7,42% de las muestras remitidas resultaron negativas a todas y el 92,58% resultaron positivas para, al menos, una de las enfermedades estudiadas. Con los resultados obtenidos es importante establecer una situación de los rodeos y a partir de allí realizar planes sanitarios que mejoren las condiciones para así minimizar pérdidas. Es fundamental concientizar a los productores sobre la importancia de la sanidad en los rodeos, para así aumentar los porcentajes al destete y la rentabilidad de su actividad.

Palabras claves: síndrome de vaca vacía, coinfección, serología.