



XX SESIÓN DE COMUNICACIONES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS ESTUDIANTILES

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

2022



Indicadores de enfermedad en equinos utilizados para tracción a sangre (TAS), en barrios periféricos de la ciudad de Corrientes

Schugurensky, J.; Maurenzi, B.; Colman, A.; Zini, A.; Tutores: Duré, K.; García, N.

Departamento de Clínicas. Cátedra de Semiología. Facultad de Ciencias Veterinarias.
U.N.N.E. semiol@vet.unne.edu.ar

Resumen:

Una problemática de la Ciudad de Corrientes es la cantidad de equinos utilizados para la actividad de tracción a sangre (TAS). Los equinos cargan más peso del que pueden y poseen escaso acceso a controles veterinarios? Sanitarios? Nutricionales? Este tipo de trabajo predispone a que los animales padezcan trastornos asociados a qué?; las lesiones en cualquier parte del cuerpo causan molestias, lesiones son severas o persistentes, por lo que padecen dolor crónico y redundan en una menor eficiencia de trabajo, lo que desencadena interacciones negativas con los tutores (golpes y/o abandonos en la vía pública). Los arneses y carros mal contruidos o ajustados pueden causar lesiones que llegan a infectarse, también pueden romperse durante el trabajo causando accidentes. Las áreas del cuerpo particularmente propensas a sufrir lesiones relacionadas con el arnés son el pecho, hombro, cruz, dorso, abdomen y base de la cola. Otras lesiones relacionadas al trabajo, causadas por el conductor (azotes) se encuentran comúnmente en los cuartos traseros y flancos. Las lesiones en las rodillas indican que el animal ha sufrido caídas o colisiones, debido a un terreno inadecuado, agotamiento, mala conformación de los cascos, claudicación, ataduras o por ser sobreexigidos. El objetivo del presente trabajo fue recolectar información sobre los indicadores de enfermedad en los equinos de tracción a sangre en la ciudad de Corrientes Capital. Las actividades se desarrollaron en el marco del proyecto acreditado 19BD01 "Recuperación de Equinos utilizados en actividades de Tracción a Sangre (TAS) y rehabilitación a través del entrenamiento para el desarrollo de prácticas educativas y terapéuticas". Se trabajó con equinos de los barrios Quinta Ferré, Sol de Mayo, Arazaty y Galván, a lo largo de 7 meses, individualizando a los tutores y a los pacientes; en estos se procedió a realizar la exploración clínica, con especial atención en los indicadores de enfermedad asociados a la actividad. Del total de 50 equinos examinados, los indicadores de enfermedades del aparato piel, locomotor, de la cavidad bucal y del estado de nutrición arrojaron un total de 40 (80%) lesiones producidas por arneses y golpes en zonas de cuello, dorso, lomo, grupa, pecho y rostro; todos mostraron algún indicador de enfermedad del aparato locomotor (mal estado de cascos, herraje inadecuado) y además 15 (30%) mostraron dolor a la palpación de tendones y articulaciones. En cuanto a la cavidad oral 15 (30%) presentaron alteraciones como palatitis (13) y puntas dentarias (15) ocasionando lesiones en lengua y carrillos; 25 (50%) de los animales mostraron un estado de nutrición inadecuado. Con los datos recabados podemos concluir que casi la totalidad de animales evaluados posee un estado de nutrición y acceso a la atención veterinaria inadecuados. Todo ello expresado en la condición corporal y en la cantidad de indicadores de enfermedad encontrados, relacionados en su totalidad a la actividad para la que son empleados, pudiendo reducirse y/o mejorar con una adecuada alimentación y controles veterinarios.

Mejorar redacción. El formato no se ajusta a la reglamentación de la Jornada.

Palabras clave: salud, lesiones, atención primaria.

Presentación: Póster.