



---

**SESIÓN DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS**  
**XXXV**  
**FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - 2014**

---



**Efecto de la presentación y composición química del alimento terminador sobre los índices productivos y rendimiento a la faena en pollos Campero INTA**

Fernández, R.<sup>1</sup>; Molinas, F.<sup>1</sup>; Sindik, M.<sup>1</sup>; Revidatti, F.<sup>1</sup>; Sanz, P.<sup>1</sup>; Escobar, C.<sup>2</sup>

**1**-Cátedra Producción de Aves, Facultad de Ciencias Veterinarias-UNNE. Sargent Cabral 2139. (3400). Corrientes. Tel.: (0379) 4430101 Interno 130. **2**-Prohuerta Corrientes. [granja@vet.unne.edu.ar](mailto:granja@vet.unne.edu.ar)

En aves para carne la presentación del alimento y su composición determinan la evolución y el resultado de los indicadores técnicos de la producción, como así también el rendimiento de la canal y de los cortes valiosos, aspectos de gran relevancia en condiciones prácticas. En el presente trabajo se estudió el efecto de la presentación del alimento y su composición proximal sobre las variables productivas y rendimiento a la faena en pollos Campero INTA. La dieta control de preparación propia fue elaborada en forma de harina en base a maíz, soja y una premezcla para alimento terminador, en tanto que como dieta de prueba se suministró un alimento comercial en forma de granulado. El análisis comparativo se realizó mediante ANOVA en un arreglo factorial, con el sexo y tipo de alimento como efectos principales. Se constataron interacciones significativas para ganancia de peso y consumo de alimento entre los distintos niveles de ambos factores, lo que hizo necesario analizar la interacción para dichas variables. La ganancia de peso durante el período del ensayo registró diferencias estadísticamente significativas ( $p<0,05$ ) con valores de  $2.120 \pm 75$  (machos, granulado),  $1.642 \pm 92$  (machos, harina),  $1.308 \pm 39$  (hembras, granulado) y  $1.129 \pm 26$  g (hembras, harina). El consumo de alimento también demostró diferencias significativas en función del sexo y presentación del alimento. La conversión alimenticia no presentó interacción significativa entre los factores estudiados lo que permitió su análisis por separado. Se constataron diferencias significativas para la conversión alimenticia con valores de  $3,77 \pm 0,11$  y  $3,56 \pm 0,19$  para las dietas control y prueba respectivamente. Entre las variables de composición corporal el rendimiento de la canal registró diferencias estadísticas significativas a favor de la dieta prueba. Se concluye que la forma física del alimento produce mejoras en los índices técnicos de la producción y rendimiento de la canal en pollos Campero INTA en fase de terminación.

**Presentación: Oral.**

