



Universidad Nacional
del Nordeste

XLIV SESIÓN DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - UNNE



Curva de crecimiento en pollos camperos hembras en dos modalidades de alojamiento y estación del año

Asiaín M.¹, Revidatti F.², Fernández R.²; Sanz P.², Romero C.², Sappa R.², Sindik M.^{2*}, Canet Z.^{3,4}

¹Estación Experimental Agropecuaria. INTA, Las Breñas. ²Cátedra de Producción de Aves. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Nordeste.

³Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario.

⁴Estación Experimental Agropecuaria. INTA, Pergamino.

* msindik@vet.unne.edu.ar

Resumen:

En el presente trabajo se analizó el patrón de crecimiento de pollos de crecimiento lento para carne bajo diferentes modalidades de alojamiento y estaciones del año. El trabajo se realizó en dos estaciones del año, otoño 2021 y primavera 2023, en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Las Breñas. Se utilizaron 36 hembras Campero INTA, distribuidas aleatoriamente en cantidades iguales en boxes con diferentes tratamientos. La cantidad de aves por box fue de 18 a razón de 8 aves por m². Se aplicaron dos tratamientos: I confinamiento total; II confinamiento parcial con acceso a parque. La duración del ciclo fue de 84 días subdividido en: Inicio hasta el día 35, crecimiento hasta el día 70 y terminación hasta el día 84. Como indicador de crecimiento se registró el peso corporal (g) individualmente, a intervalos semanales, en una muestra de cinco aves identificadas de cada grupo. Se realizaron los ajustes de las curvas de crecimiento individuales y se estimaron los parámetros de la función sigmoidea de Gompertz. Los efectos de la interacción entre ambos factores principales se evaluaron con un análisis para un DCA, con un experimento factorial 2 x 2 (dos estaciones por dos modalidades de alojamiento). Las aves de la estación Otoño en confinamiento presentaron un peso asintótico A 3.893 g ± 137,0 y una tasa de maduración para peso corporal (k) 0,1558 ± 0,00407; las aves con salida a parque A 3.786 g ± 98,5 y k 0,1585 ± 0,00363. Estación Primavera confinamiento A 3.493 g ± 72,8 y k 0,1708 ± 0,00334; las aves con salida a parque 3.584 g ± 83,3 y k 0,1704 ± 0,00183. La interacción de los efectos de los factores principales para el peso corporal asintótico no fue significativa ($F = 1,05$, $p = 0,321$). La modalidad de alojamiento no alcanzó significado estadístico ($F = 0,001$, $p = 0,975$). El peso asintótico tuvo un efecto significativo según la estación del año ($F = 8,61$, $p = 0,01$). La tasa de maduración para el peso corporal tuvo un efecto significativo para la estación del año ($F = 16,5$, $p = 0,0009$), mientras que la modalidad de alojamiento no mostró un efecto significativo ($F = 0,11$, $p = 0,740$), la interacción entre ambos factores principales no alcanzó la significancia estadística ($F = 0,21$, $p = 0,656$). Se concluye que el peso corporal no se ve influenciado por el sistema de producción, en tanto que la estación del año afecta la tasa de crecimiento de los pollos de crecimiento lento.

Palabras clave: Avicultura, sistema, peso corporal.

Eje: PRODUCCIÓN ANIMAL