



XV SIMPOSIO IBEROAMERICANO

Sobre Conservación y Utilización de Recursos Zoonéticos

MÉXICO 2014



MANEJO TRADICIONAL DE LAS MAJADAS DE OVEJAS CRIOLLAS DEL OESTE FORMOSEÑO.

De la Rosa, Sebastian^{1*}; Revidatti, María Antonia¹; Orga, Antonio²; Tejerina, Emilse¹; Capello, Sebastián¹; Pilotti, Pablo¹

¹Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Nordeste, Argentina; ²Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA), Laguna Yema Formosa, Argentina

*sebastiandelarosa@yahoo.com.ar

Introducción

Muchas razas son el resultado de largos procesos de domesticación y prolongados períodos de adaptación a circunstancias locales. Ellas reflejan una larga historia de simbiosis entre la humanidad y los animales de granja. Los animales son parte integrante de ceremonias y de costumbres de grupos étnicos (Oldenbroek, 1999). Las mujeres de la etnia qom en la provincia de Formosa, Argentina, desarrollan una actividad artesanal con lana de ovinos locales, a partir de la cual se han organizado buscando transformarla en comercial. El objetivo del presente trabajo fue definir las pautas de manejo tradicionales a las que son sometidas las majadas de ovejas criollas en el oeste de la provincia de Formosa, de donde se extrae la materia prima para el proceso artesanal.

Metodología

Se trabajó en 20 sitios de muestreos, distribuidos uniformemente en el territorio de los tres departamentos del oeste de Formosa: Matacos, Bermejo y Ramón Lista. Se realizaron encuestas estructuradas (n=82) indagando sobre los aspectos relacionados a los sistemas productivos que poseen ovinos, tomando como referencia parámetros similares a los de Perezgrovas et al (2000). Los datos en soporte papel fueron luego digitalizados y se realizó un análisis descriptivo de los diversos aspectos indagados, lo que permite tener una visión sobre la tipología de los sistemas.

Figura 1: sitios de muestreo.



Resultados

La mayoría de los productores realiza explotación ganadera mixta (87,5%), combinando producción de ganado mayor con menor, el resto produce solo ganado menor (12,5%), ambos utilizan mano de obra familiar, encargándose los hombres del ganado mayor (bovinos) y las mujeres y los niños del ganado menor y de granja (ovinos, caprinos, cerdos y aves). La existencia media ovina es de 52 cabezas por productor, estratificándose de la siguiente manera: menos de 50(63,5%), entre 51 y 100(27,1%), entre 101 y 200(7,1%) y más de 200(2,4%). La estructura de la majada se compone de: ovejas (70%), borregas de reposición (23,3%), carneros (3,9%) y carneritos de reposición (2,8%).




XV SIMPOSIO IBEROAMERICANO

Sobre Conservación y Utilización de Recursos Zootécnicos

MÉXICO 2014



Grafico 1: Estructuras medias de las majadas



La totalidad de los productores realiza pastoreo con encierre nocturno que rondan las 8 horas de duración, desplazándose los animales a distancias medias de 1,15 km diarios, tienen perros pastores (58,1%). Durante la época de parición se aparta y retiene las parturientas antes de largar a pastar la majada (52%). Los corderos no salen con las madres al pastoreo durante el primer mes de vida (67,7%). Los corrales no tienen la superficie necesaria de acuerdo al número de animales, ni es costumbre colocar bebederos con agua en los mismos.

Imagen 1: Corral de encierre tradicional ovejas criollas formoseñas.



Solo un bajo porcentaje suplementa a los animales en alguna época del año (25,8%). El único tratamiento sanitario que se

realiza es la aplicación de antiparasitarios (65,6%).

Conclusiones

El manejo que se lleva adelante con los ovinos se corresponde a una típica producción de traspato, donde las mujeres y los niños son los encargados de la atención de los animales animales menores, mientras que los hombres realizan actividades en la ganadería bovina. Las majadas son pequeñas, aunque la proporción de categorías es adecuada.

El sistema de pastoreo es sencillo, permaneciendo los animales encerrados en corrales durante la noche. El uso de perros pastores es frecuente.

La atención de la parición se realiza en los corrales, permaneciendo los corderos hasta un mes en los mismos mientras sus madres pastorean. El hacinamiento es común, por no ser adecuada la superficie de acuerdo a las necesidades de cada categoría.

Tanto la suplementación estratégica como la atención sanitaria no son frecuentes en el manejo tradicional.

Bibliografía consultada

Oldenbroek, J.K., 1999 Genebanks and the conservation of farm animal genetic resources Chapter 1. Introduction. Publisher DLO Institute for Animal Science and Health. 1-9.

Perezgrovas Garza, R. y H. Castro Gámez 2000. El Borrego Chiapas Y El Sistema Tradicional De Manejo De Ovinos Entre Las Pastoras Tzotziles Arch. Zootec. 49: 391-403.