



XVII SESIONES DE COMUNICACIONES

TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS ESTUDIANTILES
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

2018

TARSO DEL EQUINO: PRESENCIA DE UN CASO CON LOS HUESOS CUNEIFORMES 1 Y 2 INDEPENDIENTES

Soto Ramón; Resoagli Juan

Departamento de Ciencias Básicas. Cátedra de Anatomía I. Facultad de Ciencias Veterinarias.
UNNE. Corrientes. Argentina. Sargento Cabral 2139. C.P. 3400.E- mail:

ramonsotovet@gmail.com

El tarso del equino, también denominado corvejón o garrón, tiene como base ósea a 6 o 7 huesos cortos, comprendidos entre la extremidad distal de la pierna y la región metatarsiana. Estos huesos se agrupan en 2 filas: una proximal formada por 2 huesos el talus y el calcáneo. La segunda o distal formada por 3 o 4 huesos que de medial a lateral se los denomina con los epítetos de cuneiforme 1°, cuneiforme 2°, cuneiforme 3° y cuboides. Entre ambas filas se sitúa el hueso tarso central o navicular del pie, teniendo en cuenta que los huesos cuneiformes 1 y 2 por lo general aparecen fusionados. En el campo de la biología la anatomía ocupa un lugar de importancia en las ciencias médicas siendo considerada por algunos autores como la piedra fundamental de la medicina por cuanto introduce tanto a educandos como a educadores dentro del vasto mundo de la terminología científica y en el conocimiento de las leyes que rigen su organización. Es por eso que conocer la anatomía del equino y de los diferentes animales domésticos juega un papel importante en la formación del Médico Veterinario ya que brinda el conocimiento de la forma y estructura del organismo animal. El conocimiento de los diferentes aspectos morfológicos de los animales domésticos forma la esencia básica para que el futuro egresado se desempeñe con eficacia en todos los campos de la profesión, como ser la clínica, ya que la anatomía está en estrecha relación con la fisiología, la histología, la patología. Durante los últimos años, durante las clases prácticas de disección se realizan un sin número de disecciones de distintas partes que comprenden el esqueleto del equino, haciendo hincapié en las primeras clases en la preparación y armado del mismo, buscando que los alumnos puedan reconocer las partes que lo componen. Es así que se observa en un tarso de equino la presencia de huesos cuneiformes 1 y 2 que aparecen independientes. Revisando la bibliografía de cabecera de la cátedra nos dice que el cuneiforme 1 y 2, o tarsiano I y II resultan de la fusión de dos piezas óseas, pero que, no obstante, en un 20 % de los sujetos pueden encontrarse separados, en cuyo caso el cuneiforme 1 se sitúa en plantar y medial de la fila distal. Se concluye que se pueden observar casos de la presencia del tarso formado por siete huesos independientes, tal como lo nombra la bibliografía.

Presentación: Stand

Ciencias Básicas