



**SESIÓN DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS
XXXVII
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - 2016**



Prevalencia de endoparásitos con potencial zoonótico en caninos en situación de tenencia responsable de un barrio de Castelli Chaco

Rigonatto T¹*, Alvarez J D¹, Benitez A S¹, Delgado R²

¹Docentes de la Cátedra de Enfermedades Parasitarias de la FCV– UNNE.

²M.V Profesional actividad privada. *parasito@vet.unne.edu.ar

Resumen

Los animales de compañía constituyen un importante reservorio para diversas patologías zoonóticas, sobre todo los que conviven con los humanos, entre ellos encontramos a los caninos y una de las zoonosis más comúnmente transmitida son las parasitosis. El trabajo se realizó en un barrio en la ciudad de Juan José Castelli en la provincia del Chaco. El mismo consistió en tomar muestras de materia fecal e hisopado rectal de los caninos, para realizar análisis coprológico en búsqueda de parásitos con potencial zoonótico. Las muestras se recogían en frascos de plásticos con tapa rosca se enumeraba para llevar un registro, se confeccionó un relevamiento para tener conocimiento de la cantidad de caninos en cada domicilio. Luego de recogidas y analizadas una vez en el consultorio se procedió a analizar las muestras, destinando una parte para la observación por la técnica de flotación con solución de “Willis” y otra por sedimentación, el material obtenido por hisopo se extendió en un porta objeto para observar ovisacos y/o huevos de *Dipylidium caninum*. Se obtuvieron 78 muestras, las cuales se dividieron en Caninos positivos y negativos a parasitosis, luego de acuerdo el sexo en hembra y machos y en categorías adultos y cachorros. En cuanto a la población total muestreada, los adultos fueron 63 y los cachorros 15 de los cuales todos arrojaron resultados positivos. Se observó en los resultados que de los 78 (100%) caninos, 69 (88.46%) resultaron positivos y solo 9 (11.53%) negativos. De los positivos 25 (36,23%) correspondían a caninos machos y 53 (63,76%) a caninos hembras. La distribución de endoparásitos encontrados fue la siguiente: *Ancylostoma sp* 65,21% *Toxocara sp*, 21,73%; *Coccidios sp.* 17.39%; *Dipylidium caninum*, 10,14% *Tenia sp.* 11,59%; *Trichuris*; 4,34%. Más del 65% de los huevos encontrados fueron de *Ancylostoma sp*. Siguiéndole *Toxocara sp* con el 21%. La mayor prevalencia estuvo dada por nematodos, seguida de cestodos y por último protozoarios. Hemos observado que en los caninos del barrio Curishí, las medidas de control sanitario resultan insuficientes para disminuir el riesgo del potencial zoonótico de éstas parasitosis.

Palabras clave: Parásitos, salud pública.