



XXVIII Comunicaciones Científicas y Tecnológicas

Orden Poster: CM-004 (ID: 2485)

Autor: Villafañe, Luciano

Título: Desigualdades en la mortalidad por suicidio en el nivel departamental de las provincias del nordeste argentino según edad y sexo.

Director: Genero, Sebastian

Palabras clave: mortalidad, suicidio, nordeste

Área de Beca: Cs. De La Salud

Tipo Beca: Evc - Cin

Periodo: 05/09/2022 al 05/09/2023

Lugar de trabajo: Facultad De Medicina

Proyecto: (PID-2020-01) Tendencia, distribución y relación con las condiciones de vida de la población de la mortalidad por Enfermedades Crónicas no Transmisibles en la región del Nordeste Argentino

Resumen:

Introducción: El suicidio es un creciente problema de salud pública y su tendencia se encuentra al aumento en el nordeste argentino (NEA) y es necesaria información local para la toma de decisiones. Se realizó este trabajo con el objetivo de describir la situación de la mortalidad por suicidio a nivel departamental de las provincias del NEA de acuerdo al sexo y la edad.

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo y de diseño. Se utilizaron datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación y del censo de población y viviendas de la República Argentina. Se calcularon tasas de mortalidad a nivel departamental de las provincias del NEA y se realizó ajuste de tasas por edad mediante el método directo utilizando como población estándar la mundial de la OMS. Se calcularon estimaciones de desigualdad de la mortalidad por suicidio a nivel departamental, incluyendo cocientes y diferencias de tasas extremas brutas y ponderadas, así como riesgos atribuibles poblacionales.

Resultados Durante el período de estudio se registraron 6770 muertes por suicidio en el NEA, de las cuales 76,7% correspondieron a varones y 30,7% a personas de 15 a 24 años de edad. Considerando todas las edades y ambos sexos, en el nivel departamental de las provincias del NEA se produjeron una media de 3 muertes por suicidio por año (mínimo= 0, máximo=22). Los coeficientes de Gini resultaron en 0.13, 0.15 y 0.12 para varones, mujeres y ambos sexos respectivamente. Para ambos sexos se observó: cociente de tasas extremas: 4,6; Cociente ponderado de tasas extremas: 1.3; Diferencia de tasas extremas: 14.3; Diferencia ponderada de tasas extremas: 4.2; Riesgo atribuible poblacional: 2.9 y Riesgo atribuible poblacional relativo (%) 41.9. Se evidenciaron diferencias de acuerdo al sexo y la edad.

Discusión y conclusión: Este estudio ofrece información valiosa para la planificación y toma de decisiones de políticas sanitarias locales y regionales para abordar el problema del suicidio en el NEA. Los resultados muestran que es necesario adoptar medidas preventivas y de intervención loco regionales y se destaca la importancia de realizar investigaciones que profundicen estos resultados para comprender mejor los factores que influyen en el suicidio en el NEA