



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
Sargento Cabral 2139 - W3402BKG
Corrientes - Argentina
Telfax: (+54) 3794 4425753 Interno 113



10º JORNADA DE EXTENSIÓN

1 y 2 de octubre de 2015

MIXOSARCOMA ANGIOMATOSO SUBLINGUAL

López Ramos, Mayra L.¹; Ludueño, Silvia F.², Locket, Mariel B.³, Vera, Gustavo A.⁴

¹ Jefe de Trabajos Prácticos en la Cátedra de Cirugía y Anestesiología F.C.V. UNNE.;

² Adjunta en la Cátedra de Cirugía y Anestesiología F.C.V. UNNE. ³ Jefe del Servicio de Radiología y Ecografía Hospital de Clínicas. ⁴ Adscripto al Servicio de Cirugía y Anestesiología

Los tumores malignos de la cavidad bucal que se presentan con mayor frecuencia son el melanoma, carcinoma de células escamosas, fibrosarcoma, osteosarcoma y epuliacantomatoso; siendo los mixosarcomas tumores infrecuentes, pudiendo presentarse en caninos adultos con una edad media de 7 años, dato que resultó en coincidencia con nuestro paciente. Los sarcomas son blandos lobulados, con aspecto viscoso o mucoide, con tendencia a crecer por infiltración, localmente agresivos invadiendo tejidos circundantes y produciendo una pseudocápsula de células tumorales comprimidas viables. Generalmente su localización es en tejido subcutáneo, aponeurosis, piel, tracto genitourinario y corazón. En cabeza y cuello es muy rara su frecuencia de aparición, sin embargo la presentación del mixosarcoma en este caso en particular fue en la base ventral de la lengua. Tienen poca tendencia a metastatizar, tanto localmente como a distancia. Los aspirados con aguja fina no suelen ser útiles para el diagnóstico definitivo de sarcoma. La extirpación quirúrgica es el principal tratamiento indicado en perros con sarcomas de tejidos blandos, teniendo un rol importante también la radioterapia en casos de mixosarcomas no operables o incompletamente extirpados. Siendo la cirugía el único tratamiento elegido para el paciente en cuestión, debido a que no se cuenta con radioterapia en nuestro medio. El pronóstico es bueno. El tiempo de supervivencia medio en perros con sarcomas de tejidos blandos estimado es de 1416 días tras sólo la cirugía y de 2270 días tras cirugía y radioterapia adyuvante.